



出入口严格执行车辆登记及人员体温监测要求。



高科物业工作人员在白领公寓进行每日消杀工作。



园区食堂采用配餐制,工作人员在分装、打包盒饭。

一个园区的守护

——抗“疫”战纪文图专题之一

【编者按】

坚决遏制疫情扩散蔓延,全市正落实最严防控措施。近日,本报记者走上前线,各选取一个“战场”,记录株洲人民在这场战“疫”中的坚韧与奉献,以期一窥株洲抗击病毒、捍卫生命的真实场景,敬请垂注。

文/株洲日报社首席记者 吴楚
图/株洲日报社记者 谭浩瀚

一个具有发展战略意义的高新技术园区,遇上突如其来、没有硝烟的战争,该如何组织快速反击?

2月13日上午10点,我们的车辆向动力谷自主创新园逼近。在离入口至少还有20米时,关卡处的工作人员就有所警觉,立即伸手示意停车。

测体温、凭身份证登记后,我们表明来访问意图,“守门员”将信将疑,直到后座的园区工作人员伸出头帮忙沟通,我们才顺利进入园区。

安静。事实上平时这里也并非人山人海——这是打造株洲·中国动力谷的主阵地,聚集着200余家创新创业团队——这是技术密集型园区。

道路两侧的企业门窗上随处可见白色的“防疫须知”告示。一位重装的消毒人员从停车场走出来。园区的所有公共区域,每天都在定时定点“消杀”。

中车时代电动系统分公司门前,护栏规定了进门规则,保安正对大门而坐,园区工作人员黄勇上门进行每日的复工防疫检查。测体温,保安先给黄勇测,黄勇再给保安测,彼此不敢大意。

这是一个人数超7000人的园区,抗疫不打提前量,企业复工没保障。

正月十六日,入园企业株洲辉锐负责人程畅栋收到园区发来的微信,内容是市区两级最新复工通知及防疫注意事项,而后又接到电话,“通知请您转发到每位员工手中并向我们截图确认”。在那一天之内,园区联系了所有企业负责人。

一切紧张而有序。企业年轻人多,园区便用上二维码,轻轻一扫就能采集个人信息、健康信息,不必来回奔波。开放式的园区封闭式管理,行走其间,11处体温检测点随时都在提醒所有人,这是战场。

微信群成了电台,战报轮番滚动。“研发中心片区今日复工员工体温正常”“公寓片区今日新增入住全部摸排在案”“商业门面片区防疫检查已完成”……园区设立7个站点,“站长”们不敢缓报敌情。

“企业复工复产要做的事情很多,为了让防控指导及政策普及要清晰准确,我们做了些准备。”黄勇从包里掏出一摞资料,里面有复工指导清单、复工告知书、防控防疫应知应会手册等。

门外战火纷飞,屋内安心生产。株洲科力特新材料有限公司车间内机器轰鸣,一位工人神情自若地工作着,“有信心。”他话不多。



体温监测点值班人员为体温检测正常的人员粘贴标识。



疫情防控片区管理站工作人员走访企业,并向企业宣传疫情防控有关政策文件。



国内企业株洲科力特新材料有限公司已复工生产。

为全面打赢疫情防控阻击战,特别是做到依法科学防控疫情,切实指导社会公众科学按需使用口罩,大力减少口罩使用中的浪费,国家发改委发布了《社会公众使用口罩简易问答指南》。一起来了解一下:

1. 为什么要科学按需佩戴口罩?

答:佩戴口罩是社会公众预防新型冠状病毒感染的重要手段,在必要的场合,每个人都应当选择合适的口罩类型佩戴使用,做好自身防护。同时,每个人也都有责任区分不同的工作性质、生产生活场所,按照疫情的暴露风险等级,适度适当地佩戴口罩,不致过度防护,提高口罩使用效率,减少资源浪费。目前有高、较高、中等、较低、低5种不同等级的暴露风险,可以作为选择和使用口罩的指引。高、较高暴露风险人员主要是直接在一线从事疫情防控工作人员。其他人员大都属于中等、较低或低暴露风险人员。

2. 生产生活中必须佩戴N95口罩才安全吗?

答:在抗击疫情一线,属于高(较高)暴露风险的医护人员有必要使用医用防护口罩或N95等级防护口罩。在医护人员普通门诊、病房工作的医护人员,一般只建议佩戴医用外科口罩。一般社会公众没有必要,也不应提倡使用N95口罩。

3. 我不是医护人员,但工作场所在空间密闭或人员密集的场所,应当如何佩戴口罩?

答:如果您是医院、机场、火车站、地铁、地面公交、飞机、火车、超市、餐厅等相对密闭、人员密集场所的工作人员,或者是与疫情相关的行政管理、警察、保安、快递等从业人员,属于中等暴露风险人员,建议在工作场所佩戴医用外科口罩。

4. 我既不是医护人员,生产场所也不是前几个问题所说的情况,应当如何佩戴口罩?

答:如果您处在超市、商场、



口罩佩戴前按规程洗手,佩戴时避免接触口罩内侧

新华社发 徐俊作

交通工具、电梯等人员密集区,或处于普通室内办公、工厂车间等环境,或是在医疗机构就诊(发热门诊外)的患者,或是集中学习或活动的在校学生等,一般属于较低暴露风险人员,建议佩戴一次性使用的医用口罩,儿童可以选用性能相当的口罩。

5. 有哪些场合可以不佩戴口罩?

答:如果您本人健康,在居家、通风良好或人员密度低的场所,一般属于低暴露风险人员,可以不佩戴口罩。比如,家中没有疑似患者,也没有密切接触者、疫区回来的家人;私家车没有搭乘过疫区客人或者疑似患者;在通风条件好的露天劳动、工作,并和相邻人员保持适

当距离;逛公园时没有游客聚集,有条件时和周围人保持适当距离;办公室严格采取了消毒、测体温、通风措施,同事也没有疑似和密切接触者,这些情况可以不戴口罩。

6. 儿童应佩戴什么样的口罩,应注意哪些事项?

答:儿童选用符合国家标准和标注儿童或青少年颗粒物防护口罩的产品。儿童在佩戴口罩前,需在家长的帮助下,认真阅读并正确理解使用说明,以掌握正确使用办法。家长应随时关注儿童口罩佩戴情况,如儿童在佩戴口罩过程中感觉不适,应及时调整或停止使用。因儿童脸型较小,与成人口罩边缘无法充分密合,不建议儿童佩戴具有密合性要求的

成人口罩。

7. 佩戴口罩有什么要注意的?

答:选择合适尺寸的口罩。佩戴口罩前,应洗手。佩戴时,要让口罩紧贴面部,同时用左右手的手指按压鼻两侧的铝片,以减少四周的空气泄漏。医用外科口罩的鼻夹在上方,使用时要压紧。佩戴口罩后,应避免触摸口罩。若必须触摸口罩,在触摸前、后都要洗手。摘下口罩时,尽量避免触摸口罩的外面,并立即洗手。

8. 佩戴两层口罩可以更安全吗?

答:佩戴两层口罩不能增加安全性。

9. 使用后的口罩能不能重复用?

答:除了高或较高暴露风险人员,健康人佩戴的口罩可反复多次使用,包括适当延长口罩使用时间、使用次数。如需再次使用的口罩,可悬挂在洁净、干燥通风处,或其放置在清洁、透气的纸袋中。口罩需单独存放,避免彼此接触,并标识口罩使用人员。

10. 口罩什么情况下需要更换?

答:一般在口罩变形、弄湿或弄脏导致防护性能降低时更换。

11. 口罩使用后应该如何丢弃处理?

答:如果您属于健康人群,佩戴过的口罩按照生活垃圾分类的要求处理即可。如果您是疑似病例或已经确诊,则佩戴后的口罩不能随意丢弃,应视作医疗废弃物,严格按照医疗废弃物有关流程处理。(来源:新湖南客户端)

私家车主们 车内防疫注意这些

私家车是人们的重要交通工具,如何在日常的用车生活中更好的保护自己是近期热议的话题。近日,中国疾控中心官网发布的《新型冠状病毒感染的肺炎公众预防指南之私家车篇》就给出了明确答案。

1. 私家车日常如何预防?

中国疾控中心提示,一般情况下,私家车无需消毒处理,处于空旷场所时,做好通风换气。冬天开窗通风时,需要注意车内温差大而引起的感冒。处于地下停车场等密闭环境,建议关闭车窗,打开空调内循环方式进行通风。

司乘人员进入公共场所返回车辆后,建议先用手消毒剂进行手部卫生消毒。有亲友(身体健康状况不明)搭乘后,要及时开窗通风,并对车内物体表面进行消毒,可以选择合法有效的消毒剂或消毒湿巾擦拭消毒。

物体表面可选择含氯消毒液、二氧化氯等消毒剂或消毒湿巾擦拭。手、皮肤建议选择有效的消毒剂如碘伏、含氯消毒液和过氧乙酸消毒剂等手皮肤消毒剂或速干手消毒剂。

2. 私家车搭乘可疑病状者时应采取何种预防措施?

中国疾控中心提示,可疑病状者(可疑症状包括发热、咳嗽、咽痛、乏力、恶心呕吐、腹泻、结膜炎、肌肉酸痛等)搭乘私家车时应佩戴医用外科口罩,尽量与同车人员保持距离,不要开启空调内循环,适度开窗通风。

可疑病状者下车后,迅速开窗通风,并对其接触物品表面(车门把手、方向盘、车窗、风挡玻璃、座椅等)进行消毒。

3. 私家车搭乘新型冠状病毒感染的患者后应采取何种消毒措施?

中国疾控中心提示,患者下车后,应及时做好私家车的终末消毒。私家车终末消毒范围包括:物体表面(座椅、方向盘、车窗、车把手等)、空调系统和呕吐物等,消毒剂建议选择过氧乙酸和二氧化氯等,消毒时选择过氧乙酸和二氧化氯等,消毒时发动汽车,并打开空调内循环。

具体消毒方式由当地疾控机构的专业人员或有资质的第三方操作,没有消毒处理前,车辆不建议使用。其他同乘者为密切接触者,应接受14天医学观察。

搭乘公共交通工具注意哪些事项?

节后复工潮来临,为防止新型冠状病毒感染的肺炎通过公共交通传播,国务院印发了《公共交通工具消毒操作技术指南》,内容包括工作人员操作指南和旅客人员操作指南。

工作人员操作指南方面,要求公共交通工具工作人员开展以下工作:

做好物体表面消毒。日常情况下,保持公共交通工具的环境整洁卫生,采取预防性消毒措施;飞机、火车、地铁、公交车、轮船等公共交通工具运行结束后,对内部物体表面,采用含氯消毒剂进行喷洒或擦拭。

当公共交通工具上出现人员呕吐时,应立即采用消毒剂(如含氯消毒剂或消毒干巾)对呕吐物进行覆盖消毒,再使用新洁尔灭等消毒剂进行物体表面消毒处理。

加强通风换气。日常情况下,可采用自然通风或机械通风。飞机、高铁、地铁等相对密闭环境,建议适当增加空调换气功率提高换气次数,并注意定期清洁处理空调滤网。

搭乘公共交通工具要注意以下事项:

佩戴口罩、手套。旅行人员乘坐公共交通工具时,建议佩戴医用外科口罩(或其他更高级别的口罩),旅行结束时及时弃用。有条件的旅行人员可选择佩戴手套,一次性使用手套不可重复使用,其他重复使用手套需注意清洗消毒,可流通蒸汽或煮沸消毒30min,或先用500mg/L的含氯消毒液浸泡30min,然后常规清洗即可。

注意手卫生。旅行人员在旅程中应加强手卫生,旅程结束后需做手卫生。可选用有效的含醇速干手消毒剂,特殊条件下,也可使用含氯或过氧化氢手消毒剂;有肉眼可见污染物时应使用洗手液在流动水下洗手,然后消毒。

注意保持距离。旅行人员乘坐公共交通工具,有条件时,相互之间尽量保持一定距离。

积极配合工作人员。日常情况下,听从公共交通工作人员的安排,做好个人防护。当有疑似或确诊病例出现时,听从工作人员的指令,及时自我隔离,听从安排进行排查检测,不可私自离开。

社会公众使用口罩简易问答指南